


PÓLIPO UTERINO

Um pólipo uterino é a formação de um tecido anormal na camada interna do útero que, dependendo da sua localização, pode ser **cervical** (no colo uterino) ou **endometrial** (no endométrio - revestimento interno do útero).



Estes pólipos são geralmente benignos e são mais vistos em mulheres na faixa etária dos 40 aos 50 anos.

Causas:

Atualmente não existe nenhuma causa aparente que leve à formação destes pólipos, mas as mulheres que fazem terapia à base de hormônios possuem uma maior tendência em desenvolvê-los, como também as obesas.

Sintomas:

Geralmente são assintomáticos (sem sintomas), mas quando ocorrem, os mais importantes são:

- Elevada perda de sangue durante a menstruação;
- Intensas cólicas menstruais;
- Sangramento vaginal pós relação sexual;
- Sangramento vaginal na menopausa (após 1 ano sem menstruar).


Diagnóstico:

Os pólipos uterinos geralmente são diagnosticados através de ultrassonografia transvaginal, que faz parte dos exames ginecológicos preventivos de rotina.

Tratamento:

O tratamento dependerá do tamanho do pólipo. Entre as opções estão: cirurgia, medicação ou até mesmo a retirada do útero.

Um dos métodos mais utilizados para a retirada completa do pólipo é a histeroscopia. Este procedimento geralmente é realizado em ambiente hospitalar, sob sedação, com alta logo após a recuperação anestésica. O retorno às atividades rotineiras da mulher é rápido.



A Histeroscopia cirúrgica é um dos tratamentos mais utilizados para a retirada completa do pólipo.

Consulte seu ginecologista regularmente. Muitos casos de pólipos uterinos são diagnosticados nas consultas e exames de rotina.